

市立輪島病院

| コード | | |
|--|---|---|
| 0j ・たんぱく質含有量の少ないもの |  エンゲリド/嚥下食2 | ・エンゲリドミニ STIによる直接訓練等 1食あたりフルーツゼリー2品 |
| 1j ・たんぱく質含有量の多少は問わない ・ミキサーを使用し再形成した「ソフト食」を含む |  介護菜 | プリンやムース等を使用。 訓練として、フルーツマッシュも入る。 *2-1も一部含む |
| 2-1 (つぶなし) |  ペースト菜/ミキサー | ・ペースト菜 ミキサーをペースト状にミキサーゲル使用。 ・ミキサー 1品ずつミキサーにかける とろみはなし |
| 2-2 (つぶあり) | | |
| 3 ・形はあるが舌で押しつぶしが容易なやわらかいもの | | |
| 4.軟-小 ・大きさ1cm未満 | | |
| 4.軟-中 ・大きさ1cm以上 | | |
| 4.軟-大 ・カットなし | | |
| 4.硬-小 ・大きさ1cm未満 |  軟菜きざみ | 0.7cm角にカット とろみあんがかかっている。 トロメリンV使用。 |
| 4.硬-中 ・大きさ1cm以上 |  軟菜一口サイズ | 1.5cm角カット 各食種に対応 |
| 4.硬-大 ・カットなし |  軟菜 | 硬い食材や揚げ物などは避ける。 |
| 一般食 ・食材配慮あり | | |
| 一般食 ・食材配慮なし |  常菜 | 制限なし *一口サイズ(1.5cm角)の対応あり |

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| 1j ・物性に配慮したおもゆやミキサー粥のゼリー |  粥ゼリー | 7分粥をミキサーにかけスベラカーゼライトでかためる |
| 2 - 増粘剤あり ・とろみ付けしたおもゆ ・附着性が高くないよう処理をしたミキサー粥 | | |
| 2 - 増粘剤なし ・粥をそのままミキサーにかけたもの |  全粥(ミキサー) | とろみは別添え トロメリンVを使用 7分・5分・3分粥でも対応 |
| 3 ・水分がサラサラの液体でないように配慮した3分粥、5分粥、全粥 ・粒のあるゼリー化粥含む | | |
| 4-全粥 |  全粥 | |
| 4-軟飯 |  軟飯 | |
| 米飯 |  米飯 | |

