

市立輪島病院

コード		
0j ・たんぱく質含有量の少ないもの	 エンゲリート/嚥下食2	・エンゲリートミニ STIによる直接訓練等 1食あたりフルーツゼリー2品
1i ・たんぱく質含有量の多少は問わない ・ミキサーを使用し再形成した「ソフト食」を含む	 介護菜	プリンやムース等を使用。 訓練として、フルーツマッシュも入る。 *2-1も一部含む
2-1 (つぶなし)	 ペースト菜/ミキサー	・ペースト菜 ミキサーをペースト状にミキサーゲル使用。 ・ミキサー 1品ずつミキサーにかける とろみはなし。
2-2 (つぶあり)		
3 ・形はあるが舌で押しつぶしが容易なやわらかいもの		
4-軟-小 ・大きさ1cm未満		
4-軟-中 ・大きさ1cm以上		
4-軟-大 ・カットなし		
4-硬-小 ・大きさ1cm未満	 軟菜さざみ	0.7cm角にカット とろみあんがかかっている。 トロメリンV使用。
4-硬-中 ・大きさ1cm以上	 軟菜一口サイズ	1.5cm角カット 各食種に対応
4-硬-大 ・カットなし	 軟菜	硬い食材や揚げ物などは避ける。
一般食 ・食材配慮あり		
一般食 ・食材配慮なし	 常菜	制限なし *一口サイズ(1.5cm角)の対応あり

1j ・物性に配慮したおもゆやミキサー粥のゼリー	 粥ゼリー	7分粥をミキサーにかけスベラカーゼライトでかためる
2-増粘剤あり ・とろみ付けしたおもゆ ・付着性が高くないよう処理をしたミキサー粥		
2-増粘剤なし ・粥をそのままミキサーにかけたもの	 全粥(ミキサー)	とろみは別添え トロメリンVを使用 7分・5分・3分粥でも対応
3 ・水分がサラサラの液体でないように配慮した3分粥、5分粥、全粥 ・粒のあるゼリー化粥含む		
4-全粥	 全粥	
4-軟飯	 軟飯	
米飯	 米飯	

